

Дата проведения:

08.12 - Гр. № 1

11.12 - Гр. № 2

12.12 - Гр. № 3

Тема: Ознакомление с животным миром родного края

Фауна Луганщины представлена главным образом степными и некоторыми лесными животными, однако, дикая фауна бедна.

В настоящее время на территории Луганщины зарегистрировано 374 вида позвоночных животных, которые объединяются в 88 семейств и 6 классов. Распространение животных обусловлено природными условиями и факторами которые определяют их место обитания. Из хищников встречаются: волк, лиса, енотовидная собака, ласка и др. Среди грызунов наиболее распространены: заяц, сурок, хомяк, тушканчик, крот. Из пернатых хищников водятся: копчики, орлы могильники. Лес обильно населён полезными и певчими птицами: жаворонки, перепела, соловьи, дятлы, стрижи, ласточки и др. В реках, озёрах и прудах много разной рыбы.



Степной сурок



Ушастый ёж



Белка



Дикий кабан

Обитатели степи

Во влажных местах обитает жаба зеленая, удаётся также обнаружить чесночницу, активную на суше, и краснобрюхую жерлянку, более активную в воде. Жабы приносят огромную пользу, уничтожая насекомых. В северной части края изредка можно увидеть на деревьях небольшую лягушечку величиной в 3—4 сантиметра — квакшу обыкновенную. У нее концы пальцев снабжены присосками, позволяющими передвигаться по ветвям. Спинка у нее ярко-зеленая, что делает животное малозаметным среди листвы. В озерах лесной зоны северной части Луганщины водится тритон гребенчатый — хвостатая амфибия. Тритон обыкновенный небольшого размера — до 8 сантиметров, а гребенчатый — крупное земноводное, длина его тела 14—15 сантиметров. У самцов обоих видов весной в брачный период появляются на спине фестончатый гребень и яркая окраска брюха.



Степная гадюка



Ящерица живородящая

Из пресмыкающихся наиболее широко распространены всем хорошо известные ящерицы: в лесной зоне — ящерица живородящая, в степной — ящерица прыткая. Существа весьма прожорливые, истребляющие громадное количество насекомых, чем приносят немалую пользу в борьбе с вредителями. В нашем крае водится и веретеница безногая, довольно крупная, до 30—40 сантиметров длиной, ящерица. Отсутствие ног делает ее схожей со змеей, что нередко стоит ей жизни. Наиболее распространенные из рептилий — уж обыкновенный и водяной, змеи медянка, полоз четырехполосый, желтобрюх, иногда достигающий в длину до двух метров. В Луганщине регистрируется полоз узорчатый. Это западная граница его ареала. Встречается болотная черепаха.

Тестовое задание.

1. Загадки:

Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая для лета
Для зимы другого цвета
(_____)

Хитрая плутовка
Рыжая головка
Пышный хвост-краса
Кто это (_____).

Пышный хвост торчит с верхушки,
Что за странная зверюшка?
Щелкает орехи мелко
Ну конечно это (_____)

В густом лесу под ёлкой,
Осыпанной листвой,
Лежит мешок с иголками,
Колющий и живой.
(_____).

Кто зимой холодной ходит злой
голодный (_____).

2. «Кто где живет?»

Где живет белка? (_____)

Где живет волк? (_____)

Где живет ёж и лиса? (_____)

3. По какой причине в зоне степей не растут деревья?

4. К степным птицам относятся:

Фото выполненного задания и ответы на вопросы присылай
на электронную почту kostyuknad1970@yandex.ua
с указанием имени фамилии