

Занятие кружка

«Любители домашних животных» на тему:

«Проведение спаривания кроликов»

Дата: 11.01.2021

Важным моментом в кролиководстве становится спаривание кроликов. Эти животные рано созревают, отличаются высокой плодовитостью и кратким периодом сукрольности, а также могут совмещать лактацию с беременностью. Они легко размножаются в естественной среде, но далеко не всегда готовы к оплодотворению в неволе. Чтобы случка прошла успешно, стоит знать некоторые правила ее проведения и быть готовыми к сопутствующим сложностям.



Полозрелость

Половозрелость у кролей средних размеров наступает уже в 3-3,5, а у крупных – в 4-5 месяцев. Физиологическая зрелость приходится на более поздний возраст и зависит от особенностей ухода, кормления, индивидуальных и наследуемых характеристик. В среднем к 4-7 месяцам полностью созревают даже наименее скороспелые особи.

При достижении живой массы 3,5 кг их можно пускать в случку в целях разведения.

У представителей семейства Зайцевых полностью отсутствует сезонность полового цикла, то есть оплодотворение может производиться в любую пору года. Причем в благоприятных условиях процесс можно повторять уже на следующий день после окрота. Здоровая крольчиха способна совмещать беременность и лактацию без вреда для новорожденных.

Однако охота у небеременных особей наступает неравномерно, каждые 5-6 дней весной и летом, немного реже с середины осени и зимой. Причем спаривание в холодное время года, с ноября по март, дает более здоровое потомство, с крепким костяком, хорошим иммунитетом и лучшими племенными характеристиками. Тогда как теплый период лучше сказывается именно на количестве крольчат.

Выбор производителей

Выбирая пару для размножения, стоит оценить внешний вид каждой особи, взвесить, провести осмотр и понаблюдать за поведением в течение 2 недель. Они должны соответствовать таким критериям:

- упитанное туловище весом не менее 3 кг, с развитым костяком, но без ожирения;
- отсутствие физических отклонений и увечий (непропорциональное развитие, наличие горба);
- возраст от 4-8 месяцев и не более 3-4 лет при регулярных спариваниях;
- крепкий иммунитет обеспечивает прививка не менее чем за 20 дней до случки;
- внешность, соответствующая породным стандартам, без активной линьки и заболеваний на текущий момент;
- высокая половая активность и готовность репродуктивной системы к воспроизведению потомства;
- плодовитость определяется количеством оплодотворений и рожденных здоровых детенышей;
- отсутствие со стороны самки агрессии, безразличия или предрасположенности к поеданию детенышей.

Возможные неудачи

При наступлении половой зрелости самка не всегда подпускает к себе кроля. При этом не следует повторять случку между этими особями в тот же день, лучше подождать до следующего или выбрать для этих целей других питомцев. Виной тому становится не только отсутствие активности, но и кокетство со стороны крольчихи.

Домашнее задание: если у вас возникли вопросы, присылайте их на электронную почту clairineditasha@mail.ru.

